

# Saúde em Dia


:: Informação para sua qualidade de vida ::

Informativo da Vaccini | Está chegando a estação do VSR – Palivizumabe – Ano 3, Número 1 – Fevereiro de 2017

## ESTÁ CHEGANDO A ESTAÇÃO DO VSR


Saber mais sobre esse vírus ajuda a salvar vidas

Quando o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) penetra no organismo humano, através dos olhos, do nariz ou da boca, e atinge o sistema respiratório, ele causa a inflamação de pulmões, brônquios e bronquíolos. O VSR é o principal agente dessas infecções respiratórias agudas – importante causa de doença e mortalidade de crianças em todo o mundo.



## VSR É RESPONSÁVEL POR

> **50%**  
Infecções respiratórias em crianças menores de 1 ano de idade.



> **65%**  
Internações de bebês nascidos prematuros.

## RISCOS MAIS FREQUENTES

- Pneumonia
- Bronquiolite
- Traqueobronquite

O risco de doença grave é alto em crianças nascidas prematuras, com doença pulmonar crônica da prematuridade e/ou doenças cardíacas, devido a fatores como: brônquios de menor diâmetro, sistema imunológico menos desenvolvido ou menor quantidade de anticorpos recebidos por meio da placenta.

## FIQUE POR DENTRO!

### SINTOMAS

O quadro clínico inicial é semelhante ao de resfriado ou gripe. Mas, **atenção:** se surgir o sintoma de dificuldade respiratória, procure atendimento médico!

### DIAGNÓSTICO

Exclusivamente por meio de exames laboratoriais.

### REINFECÇÕES

O organismo não cria imunidade ao **VSR** após o primeiro contato. Portanto, um bebê que desenvolve bronquiolite pode apresentar episódios recorrentes.

## SAZONALIDADE DO VSR NO BRASIL



- Norte: Fevereiro a Junho
- Nordeste, Centro Oeste e Sudeste: Março a Julho
- Sul: Abril a Agosto

## PREVENÇÃO

O uso de **Palivizumabe** é a forma mais eficiente de prevenção contra o VSR. Trata-se de um anticorpo pronto, definido com "anticorpo monoclonal específico", que neutraliza o vírus circulante na corrente sanguínea e inibe sua proliferação.

**Indicação:** 1 dose mensal durante 5 meses, sendo a primeira aplicada um mês antes do início do período de sazonalidade.

## PALIVIZUMABE - RECOMENDAÇÕES

Indicação em bula	Ministério da Saúde	Sociedades médicas SBIm* e SBP**
<b>Prematuros até 35 semanas gestacionais</b> – indicado no primeiro ano de vida.	<b>Prematuros até 28 semanas gestacionais</b> – indicado no primeiro ano de vida.	<b>Prematuros nascidos com menos de 29 semanas de gestação</b> – indicado no primeiro ano de vida.
<b>Bebês com Displasia Broncopulmonar</b> – até o segundo ano de vida.	<b>Bebês com Displasia Broncopulmonar</b> – até o segundo ano de vida.	<b>Bebês nascidos entre 29 e 32 semanas</b> – até o sexto mês.
<b>Bebês e crianças com Cardiopatia Congênita</b> – até o segundo ano de vida.	<b>Bebês e crianças com Cardiopatia Congênita</b> – até o segundo ano de vida.	<b>Bebês com Displasia Broncopulmonar</b> – até o segundo ano de vida.
		<b>Bebês e crianças portadores de doenças cardíacas e pulmonares</b> – durante os dois primeiros anos de vida.

\* Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) \*\*Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

## ONDE ENCONTRAR O PALIVIZUMABE

O Ministério da Saúde oferece gratuitamente para bebês e crianças que se enquadram em sua classificação.

Para aqueles que se encontram nas demais classificações apresentadas na tabela acima, o **Palivizumabe** é pago e está disponível apenas nas clínicas privadas de vacinação.

Fonte: Dra. Isabella Ballalai  
(CRM-RJ: 52.48039-5)  
Diretora-Médica da Rede Vaccini

Para saber mais acesse:

<http://vaccini.com.br/immunoglobulinas/palivizumabe-synagis>  
<http://familia.sbim.org.br/vacinas/vacinas-disponiveis/106-palivizumabe>

Para mais informações, consulte o seu médico.

**Cuide-se bem!**

